

204

Istituto Ortopedico Rizzoli
BOLOGNA

N.

Li 13 agosto 1918

Cognome, Nome e Paternità del Malato

Della Croce Ignor
Rizzero
Di Roberto
Tenente
156 fanteria

Accompagnamenti

DOCUMENTI ALLEGATI
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

L'ammalato suddetto, è ammesso alle infermerie, Classe colla retta
di L. al giorno.

IL SEGRETARIO

204

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SEZIONE FERITI DI GUERRA

Reparto *Ufficiali*

Letto N. _____

Ammissione *13 Agosto 1918* Dimissione _____

Cognome e Nome *Cont. Della Croce Sig. Ruggiero*

Luogo di nascita *Vigevano (Pavia)* Età *29*

Reggimento *156^a* Corpo *Santana*

Diagnosi _____


ANAMNESI

Fu ferito il 16 settembre 1918 a M. San Michele (linea 4) da pallottola di fucile Mauser alla coscia sinistra con fuoriuscita del proiettile al lato interno della coscia stessa; il proiettile stesso entrò poi al lato interno della coscia destra causando frattura comminuta del femore destro. Fu medicato al posto di medicazione reggimentale. Tale infero inviato all' Ospedale di Torre, ove gli fu estratta la pallottola, trasferito quindi all' Ospedale di Gonnas, Ospedale Militare Principale di Brenna, Ospedale Mazzini di Genova, Ospedale Hotel Brun di Bologna. Entra in quest' Istituto per le cure del raso.

STATO PRESENTE

Condizione generale buona.


Presenta all'arto inferiore destro = neoplasia articolare al ginocchio
 vasta cicatrice alla parte interna della coscia irregolare aderente al
 femore. altra cicatrice alla parte esterna lunga 10 cm. pure aderente
 all'osso. altra cicatrice operatoria alla parte anteriore ed inferiore lunga
 otto cm. irregolare, aderente all'osso sottostante. La gamba si trova in
 buona condizione di sviluppo. Alla parte media della coscia alla palpazione
 rilevansi callo di osso del femore. Alla parte posteriore della gamba e alla gamba
 inguine e coscia cicatrice operatoria
 lunga otto cm. Al piede trovan-
 si porzioni di equinismo. i mus-
 coli del piede sono lacerati
 e dolorosi -
 Si nota ingrossamento del polso
 riconoscimento di 8 cm.




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA-ROMAGNA
 Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

DATA	DIARIO
	<i>In sessione chinesi terapeutica.</i>



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

STATO PRESENTE


Tram. Abitiro est inferiore aut.

Alla parte posteriore ed inferiore della matrice al punto d'inserzione del proiettile (pallottola di piombo) si nota una tracciatura di 3×4 An.; perlacea leggermente nodosa ed aderente.

Il proiettile attraversa le parti molli e fuoriuscito alla regione
inferiore, ove si nota incisione, cogli stessi caratteri della
precedente. Il proiettile ~~meramente~~ ⁱⁿ penetrato attraversando la coscia

distesa penetrando alle ^{di} faccia interna in si nota sinistri bel-
lio operatorio di 12 cm: irregolare notevolmente infossato ed
altamente ^{allargato} lungo il margine interno del quadrupite per una
estensione di 10 cm: e per una larghezza di 8 cm. ^{la 4^a in doll.} ~~la~~ linearchè.

Si nota matrice operata e infettata e aderente in fin istot.
To il proiettile. Alla faccia esterna della zona matrice ope-
ratrice affila di 80 cm. nodoso, notevolmente aderente; altra



si tratta faccende postume
e della cassa nel suo
interio, atteso che H. è

aderente in parte infornata
Cicatrice operatoria alla far-
inge posteriore del Tiroide
di Schilli di 2^a stua; arrossa-
to, notevolmente aderente

In corrispondenza della vol-
ta plantare nella ma-
fetta mediana cavi-
operatore. puntiforme. *aduna*

Ho l'onore di Sua ultima lettera
 e mi sono volato alle risposte.
 Sua libera - ginocchi

in totale dipensione del movimento di flessione, che è possibile per soli 30 gradi. Il movimento del piede con estensione, flessione ed estensione complessivamente per soli 30°.

lunghezza dell'arco spina nas-
care, a dist. An: 88 - a mitt. 90
Evidente è l'atropia nell'inten-


auto. Si constata valle deforme
e frattura d. femore consoli-
data ad angolo aperto verso
l'interno. Pt. rotula mobile,
pure limitamente. Il piede è
in posizione di estinzione e non

no. È stato provveduto il
pa. con Tallone e scuola com-
mo del piede. Per alcuni ^{giorni}
per il ginocchio e per piede ^{coro}

zione di gesso per la persona per
male. Ha raggiunto una flessione
pericolosa la posizione prima di
venire rimossa. L'assistente l'atto
di M. è molto per le decisioni del caso.

sapienza dell'accostamento dell'arte e del variegamento del piede. Per alcuni giorni
 mi fu sottoposto a cure manuali mescolate per il ginocchio e pel piede.
 Il 14^{to} di governo ^{trifido e lieve fuor d'ordine} procedetti alla applicazione di gesso per la flessione per
 ratal del ^{ginocchio} ^{in tre tappe}. Colto il gesso col quale si era raggiunto una flessione
 parata a 30 gradi la finitura. Venne a liberare ^{osservare la posizione primitiva}
 giudicando in tal l'interiore con Kinesiotape e ponendo rimando a 20 gradi l'atto
 operativo che potrebbe riuscire utile, si iniziò l'

DATA	DIARIO
	Si giudica che la lesione riportata dall'ufficiale Ten. Della Croce e per la quale fu in cura in questo Istituto non sia compres- sa fra quelle contemplate dalla tabella. A ciò perché non risulta dal trauma patito in azione guerresca, abolita la funzione dell'arto né di un segmento di esso; ottiene migliore funzionale dalla cura in Istituto; ^{che} potrebbe camminare senza aiuto di bastone. 22. VII. 1918. <i>Al. Maggiore Medico Dirigente</i> <i>Cap. Castelletti</i>



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA-ROMAGNA
 Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

DIARIO

Allen

8. Obb arch inf. olestro

Parte posteriore superiore dello scudo ^{AD} al punto di entrata
di proiettile di palla di fucile ^{2. mod} cicatrice ovale di 3 cm x 4 cm.

per laccia leggermente nodosa ed aderente, proiettibile
attraverso alle pareti molli e ^{fucinare} usata alla fiamma in

ferma della radice dell'arte alla regione ischiatica ove
si vedono i caratteri della prima. ~~L'osso~~

Le

si nota ^{nuove anguilli trovate} cicatrice con ^{caratteristici} caratteri di penetrazione alla faccia interna in ^{una} cicatrice pellico operatorio di 12 cm. per regolare notevolmente infornato ~~col~~ aderente.

Lungo il margine interno del quattreschite per una estensione

di 10 cm. e per una larghezza di 2 si nota cicatrice opera-

poria infossata e aderente; ivi fu estratto il proiettile.
Alla base esterna della coscia vi si trovò l'apertura orificiale di 20 cm

*Alla faccia esterna della coscia viatrice operatoria Asiale di 20 cm
mobilità involontaria aderente altra viatrice faccia posteriore delle*

coscia del tuo terzo medio $oli' 11$ cm. affale aderente in parte infornata. Cistruce operatorio ^{all} faccia posteriore del femore ^{di} achille

infornata, Eistricce operatorioⁱⁿ faccia posteriore del tendine³ achille.
 4 em. arrociata notevolmente aderente. Amargine interno luo

em. abbassata notevolmente al centro. ~~Il margine esterno~~ ^{Il margine esterno} ~~si~~
corrispondenza della volta plantare nella sua parte mediana
e il piede operatoria puntiforme aderente. Questo due ultime

diatrice operatore's puntiforme aderente. Queste due ultime
diatrici sono obbliti alla polifazione.

Anche liberi ginocchi ^{inglese} con limitazione ^{di movimento} del movimento di ^{con precauzione} ~~possibile~~ ^{non} ~~progradi~~ ^{progradi} ~~in avanti~~ ^{colui} ~~del~~ ^{del} ~~picolo~~ ^{affidando} ~~movimento~~

possibile solo 20 granchi: 20 granchi: Tolva, del piccolo offuscato
completamente per soli
offuscato per 20 granchi. Lunghezza pinna macolare a ol: 82 cm
1.2 a 1.5 cm

a s. 90 cm. involate e bruciata sulla arista ~~stadera~~ arte dell'intero arco
Hada collo cefalino di p. st. di f. m. consoliato ad abigolo.

Handa collo orfame in press. di ferro, contorniato ad angolo
to verso l'interno la rotella muove le mani e le mani. Piede in posto
di adprimere una vortice e una vortice che si muove con la mano

[illegible]

espressive dell'accorciamento dell'arco delle curve e del picco nella
zione. Quasi terapeutica. E per alcuni giorni dopo tutto posto a
stima e con un po' di malumori e un po' di malumori.

ti movimenti manuali e meccanici, pel ginocchio e pel
una giovamento si proceda all'applicazione di gesso per la

una giovanetta si presentò in apprensione di gesso per la
fibrata del ginocchio in tre pezzi. Detti il gesso col
l'incor. rattinuto una fibrata forata di 16 gradi. L.

Si aveva raggiunto una flessione portata di 30 gradi. La
vera punta riprendere, e riprendere la primitiva posizione.

isole di cui molti hanno operato e che potrebbe riuscire utile

colore di un mulo, e sempre persuaso che potesse riuscire utile
à l'Uff. accontento dell'io me chio per li documenti del caso.

[illegible][illegible]

OSPEDALE⁽¹⁾

OSPEDALE MIL. DI RISERVA "MAZZINI-CELESIA",
IV.° GRUPPO-GENOVA

Riparto I: Chirurgia = Ufficiali Data di

Data di entrata 31 Marzo 1916

Data di eventuale trasferimento

SUCCESSIVI TRASFERIMENTI

OSPEDALE

durata della degenza dal	al
» » » dal	al
» » » dal	al
» » » dal	al

Data di uscita definitiva

Cognome Deha Croce

Nome Tuggero

Paternità

Maternità

Esercito

Corpo 156^o Reg. Fanteria

Grado Ceniente

Class 1889

Numero di matricola

Distretto

Data di nascita

Inscritto di leva del comune di

Fondamento di

Circondario di

Diagnosi. (2)

Frattura comminuta aperta
del femore di. da ferita a. Suco
(facile), complicata da setticemia
con carie e necrosi dei frammenti
- anchilosì fibrosa dell'artico lasso
ne del ginocchio e piede destro.
Accorciamento dell'arto cent. 8.

Esito.

Vaccinazioni profilattiche.

VACCINAZIONI ANTIVAILOSE		VACCINAZIONI E RIVACCINAZIONI ANTIFTICHE E ANTIPARATIFICHE				VACCINAZIONI E RIVACCINAZIONI ANTICOLERICHE			
Mese	Anno	Mese	Anno	Complete	Incompiute	Mese	Anno	Complete	Incompiute

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

Siero-Profillassi antitetanica.				
	Giorno	Mese	Anno	Siero usato
1 ^a iniezione				
2 ^a > 				
3 ^a > 				

(1) Per gli ospedali da compilare separatamente.

(2) Sia scritta senza abbreviazioni e per le lesioni traumatiche siano indicati: ...

(2) Sia scritta senza abbreviazioni e per le lesioni traumatiche siano indicate sede e definizione anatomica della ferita, lesioni concomitanti

GAETA - TIR. STAB'L. MILITARI 2: PLIA

X Narra il Sottotenente Della Croce di essere stato ferito il 16 settembre da pallott. di fucile alla gamba ds. mentre era in combattimento sul mt. S. Michele. Fu medicato prius al posto di medicazione del Regg. e poi a Romans; poi al L.O. C. di Versa P. 028. Il 17 tempe gli estrassero la pallott. Il 29 andò a Concord Osp. C. 006, in cui fu operato per tentare di togliere i focolai d'infezione. Il 1° Otto brs andò a Brescia Osp. Principale. Il 12 fu nuovamente operato. Il 27 novembre subì una terza operaz.; gli asportarono due frammenti d'osso, gli fecero la sutura metallica del femore; il 31 Marzo 417 venne a Genova in convalesc. Osp. Bassini-Celasia. X


Esame Olt^{ro}: Tutto l'arto infer. di des. si presenta deformato, aumentato di volume per infiltrazioni delle parti molli. L'osso completamente atterrito nella sua normale lunghezza, descrivendo per quanto riguarda la coscia ed il bacino un'ampia curva a convessità esterna. Sulla superficie anter. della coscia al terzo medio si nota una cicatrice di 15 cm. di lunghezza; altra lunga cicatrice di 20 cm. circa sulla faccia esterna praticata da chirurgo nell'atto operatorio, precedentemente eseguito. Si nota infine un seno fistoloso alla radice della coscia nel punto di unione della superficie anteriore con la poster. Introducendo lo specillo, esso va orizzontalmente a raggiungere una superf. di osso scoperto, che si avverte scabro irregol. della superficie è data precisamente

(1) Anche nell'anamnesi, allorché trattasi di lesioni traumatiche, dovrà indicarsi con precisione la causa vulnerante, le circostanze che determinarono le lesioni stesse, nonché la data e la località, in cui furono riportate.

dai frammenti della frattura del femore. I movimenti passivi dell'articolazione ilio femorale di destra sono limitatissimi; così pure quelli dell'articol. del ginocchio, sono aboliti completamente i movimenti attivi. I movimenti delle suddette articolazioni risvegliano vivi dolori. Fissando il frammento inferiore si avverte abbastanza chiaro il rumore di scricchiolio e si compiono dei piccoli movimenti. Il piede destro è in posizione equino, varo con limitati movimenti dell'articolazione tibio astragala.

La radiografia ci rivela nettamente la frattura della diafisi femorale, e precisamente all'unione del 3° superiore con il 3° medio del femore. I due frammenti sono disposti quasi ad angolo retto. Gli estremi dei frammenti ossei sono attraversati da una metallica dovuta a precedente atto operatorio di osteografia del femore. Non vi era accenno a neoformazione di tessuto osseo, venendo quindi a mancare il saldamento dei frammenti della frattura.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

Conte Della Croce Ruggiero

Radiografia cefica destra

22-3-1917

SPEDIRE IN
AZZINI CELESIA - GENOVA




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico




IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

Gen. ^h della Croce Ruggiero

- Radiografia caviglia sinistra -

2 - 4 - 1916

OSPEDE MILIT. SOCCORSO DI RISERVA
CAZZINI CELESIA - GENOVA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI