



ANAMNESI

ANAMNESI

Finito il 24 Maggio 1917 a Casarsa della Delizia (Trev.) da un medico
di granata al 3 infanteria della coscia sinistra. Medico
al posto di Melinariano reggimentale indi inviato all' Osped.
letto da campo N° 001 a S. Flaviano l'ammesso per la prima volta
trasferito all' Ospedale Gariboldi di Bologna: il 13 agosto
all' Osped. Regina Madre in Roma dove subi un suc-
cesso operativo - il 25 Novembre all' Osp. Kienitz
ripreso stessa città. Il 28 aprile 1918 inviato allo stabil-
imento balneo-militare di Ischia - il 10 maggio al
l' Osped. Boeri di Roma - il 1 Luglio all' Ospedale
San Vito in Torino nel quale ebbe una licenza di con-
valutazione di giorni ventiquattro il giorno 16 ottobre 1918
Durante la licenza ~~veniva~~ che egli passava in Bologna
veniva ricoverato in quest' Istituto per cura speciale

STATO PRESENTE


Individuo di costituzione normale. Colorito pallido, mani ungueali e pannicelli adiposi bene sviluppati. Organi viscerali sani.

Art. 3° inf. Sinistro - Notabile atrofia delle muscolari della coscia e della gamba.

Vasta cicatrice della lunghezza di centim. 16, in parte aderente ai tessuti sottostanti, viscosa e cute rossa sottile, alla regione posteriore della coscia 3° inferiore sulla linea mediana. L'apice della cicatrice giunge fino alla metà della regione poplitea.

Altra piccola cicatrice alla regione esterna della coscia 3° inferiore.

Mobilità dell'anca normale - Elongamento che si presenta normale per forma, ha appena 10° di escursione



La rotula è in posizione normale per forma, ha appena 10° di escursione. La rotula è in posizione normale per forma, ha appena 10° di escursione.

Nessuna differenza di lunghezza fra i due arti.

Circonferenza coscia 546

" " S. 40

" " gamba 530

" " S. 29.

Presenta inoltre una cicatrice in corrispondenza del 3° inf. della coscia. La cicatrice è infondata e interseca il tendine acrio. È l'entità di una ferita da pallottole di 1889 che dator è inglobata nel parenchima del fegato.

DATA


DIARIO

23.X.18.

Esplorazioni. Gamba sinistra -

Taglio di Y rovesciato ricorda la forma solita, alla sola differenza che la gamba superiore dell'Y è poligona in senso proximale più che di consueti, tiene e mette completa mente in luce tutto il braccio quadruplo e parte del braccio del retto anteriore - L'angolo 2, molto largo, del braccio quadruplo dopo avere duramente attraversato le vene di due vasi il braccio stesso - Il punto punto, tendenza di flessione nel punto ventrale - La regione è in istantanea sottile e sottile causa, una delle vene fra rotule e primo condilo e - parte del nervo superiore col primo condilo del condilo - Contribuisce anche le vene molto spesse per i retinanti laterali del rotule e si può notare la rotazione, nonché il disassamento dei retinanti stessi - Riuscendo a basso il braccio rotule si vedono due vene non molto riunite, ma molto raggruppate, fra rotule e supina cubitale, una dei condili - Si segna con nettamente il braccio e dei retinanti rotule - Si nota con più volte a partire il braccio in flessione ad angolo retto - Nota che anche il leg. crociato ant. è molto teso - La supina cubitale dei condili è in minima ben convoca - Due e tre dei bottoni di quadruplo, di clausura, con buona istruzione di vene, colle parti e sottotutto - Si può fare con un angolo e manovra appoggiare a tutto il braccio unghie del nervo superiore, spingendo le vene molto,

Pulso Temp.






SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

in alto sotto le vene del cranio, e dentro completa
la mappa fenestra. Della fenestra si rischiarisce un vanto
lento, spazioso col quale si ripete tutta la mappa
fenestra, così da evitare connessioni adatte o panni
molecolari sottili. Il solo nappo il nappo
della carta lignea concludono ogni nappo.
Pittura in alligatore con rete fine di panno quadrato
di rete dei vestiti al fine di panno. Pitture dei vestiti
notabili. Intra parte smorta smorta.
Pittura smorta in una.
Danni generati panno. Panno e panno.
Danni nappo.

1. Panno. Si nappa. Fatto sottile. Si panno a panno.

2. " Si con tutto un panno smorta in compagnia della
parte di panno della panno. Si panno.
Si nappa con si nappa del panno.
Nuovo panno lura dell'ornamento. Si da erito
a circa 150 cc. di sangue.

15/11 Nuova penna. Finitura circa 100 cent. c. di nappa
lungitudinale

24 XI - 10 Flessione attiva del ginocchio può raggiungere i 50 gradi
indolente. Persiste il lieve versamento smorta.
Non si è rischiaramento laterale.

2 XII - 11 Persiste l'angolo minimo di 130 gradi.

30 XII - 18 Radiografia e fotografia.
(Mittman) Via Valadier 1183. Roma.

11 - I - 919 Angolo minimo col De Quervin
flessione 110° gradi estensione 160° gradi.