



*Quinesio*  
**ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI**  
SEZIONE FERITI DI GUERRA

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI  
PADIGLIONE MUTILATI  
BOLOGNA

Reparto

Letto N. 90

Ammissione

26 febbraio 1918

Dimissione

16 marzo 1918

Celibe

Cognome e Nome

**Rambaldi Cesare**

« Soldato »

Figlio di

Tommaso e Tella Macagnani Clemente

Luogo di nascita

Medicina « Bologna »

Età 25/1893

abit. Medicina di Fiorentina

« Bologna »

Reggimento

27

Corpo

Fantaria

Diagnosi

Callo osseo deforme al 3° inf. femore.  
Rigidità alla flessione del ginocchio  
destro, erio fita di pallone deforme

**ANAMNESI**

Asferica di essere stato ferito il 15 settembre 1916 a Vertova (Gorizia) da una pallottola di fucile che lo colpì sopra al ginocchio destro. Fu trasportato all'ospedale da campo Villa Quosa, 3 giorni dopo fu inviato a Parma dove il 15 novembre fu un atto operativo per l'eliminazione della pallottola alla coscia. Il 29 febbraio 1917 fu inviato in licenza di convalescenza di mesi 2, finita la quale si presenta al deposito che lo invia all'ospedale Principale di Padova, in seguito fu trasferito all'ospedale Quercia di Firenze, il 29 giugno fu inviato in licenza in attesa di congedo, il 26 febbraio 1918 detto sua richiesta entra al Rizzoli.

6 marzo 1918

(massima estensione del ginocchio)

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
S. S. R. R. Emilia-Romagna  
S. S. R. R. Emilia-Romagna  
S. S. R. R. Emilia-Romagna

(masseria estone del ginocchi)



IRCCS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · RIZZOLI

6 marzo 1918

CS · ISTITUTO · ORTOPEDICO · R

(Massima flessione del ginocchio)

S. Edoardo Rambaldi Cesare - Classe 1893 - 17. 10. 1918

Soldato Rambaldi Cesare - Classe (1893) = 27. 10. 1901



PIANO DORSALE

*Spagna*

STATO PRESENTE

Giallo osseo del fuso al 3.<sup>o</sup> inferiore del femore destro.  
 Il ginocchio destro è in atteggiamento di lieve valgus - Allargarsi  
 artro estensione del 3.<sup>o</sup> inferiore del femore 2.20 cm. cicatrice  
 irregolare, ~~superficiale~~, ~~avanti~~ ~~lunga~~ cm. 17 chin. - Altri  
 piccoli cicatrici si notano distintamente all'angolo = d'estensione  
 del ginocchio e cingolo, la flessione si attivamente che passiva  
 veramente si compie solo per circa 120°. Il piede è normale.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
 EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

6 Maggio 1918 - Cura a Carattere Scientifico




IRCCS-ISTITUTO-ORTOPEDICO-RIZZOLI



(Massima flessione del ginocchio)

S. Edato Rizzoli Editore - Classe (189) - 17.7.18



PIANO VENTRALE

PIANO DORSALE

