

2-2-918 1^a medicazione - Anestico - L'estern è stato
all'estern. Si sostituisce: Dressing in gesso con garza per
inibizione con clorazol - Scarso recupero.
Medicazione con clorazol - Lo strappamento è aumentato
Medicazione a giorni alterni - con clorazol.

Febbraio 1918 Dopo la solita medicazione al clorazol si copre la
gamba con una striscia di cerotto per avvicinare i bordi stral-
ciati.

Febbraio 1918 Temperature 37.8 - 39 vesperale

" " 38.3 - 38.3 "

" " 37.3 - 38 "

" " 37.4 - 37.5 "

" " 36.5 - 37 "

" " 37 - 36.9 "

" " 36.5 - 36.7 "

maggio (Influenza) ammalamento delle fauci - Cefalea -
malessere generale - aspirina
Temp. 38.5 - 38.8 sup. (Ditta speciale)

Giugno " 40 - 39.3 "

" " 37 - 38.7 "

" " 37 - 37.3 "

" " 36.3 - 37.7 "

Guarito

Provisto di pilone articolato 44-37

Giugno 1918 Ha subito con dolore le visite di ragguaglio e quello
medico collaterale. Ha dichiarato di aver fatto il quindici
del Collegio di medicina. Puntone di scuola 1917-1896

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SEZIONE FERITI DI GUERRA

Reparto 28- Ottobre 1918 Letto N. 108
5- Settembre 1918 2 ottobre 1918
Ammissione 5 Ottobre 1917 Dimissione 8 Luglio 1918
Cognome e Nome Braccini Corrado (soldato)
Luogo di nascita Lano (Piemonte) Età Cl. 1896
Reggimento 258 Corpo Fanteria

Diagnosi Amputazione coscia sinistra 32 superiore
e. di granata


ANAMNESI

Riferisce di essere stato ferito l'8 luglio 1917, sul Monte
Fratta da schegge di granata che lo colpì alla gamba
sinistra e alla testa fu medicato a un vicino posto di medi-
cazione, poi fu trasportato a un ospedale da campo 104
dove dopo pochi giorni subì l'amputazione della coscia
sinistra al 32 inferiore, ^{amputato il 27 luglio 1917 al Seminario di Ciriadale su gamba sana} successivamente fu trasferito
al Seminario di Ciriadale poi al Contumacia di
Ciriadale, ^{a Volp, a Mantova,} all'ospedale Militare di Mantova, al
Marina di Bologna donde proviene.

STATO PRESENTE

Non come lungo cm. 5-0 Estremo ancora aperto con
superficie sanguinante - Cisti di Chirurghi a tutto della
sia ancora aperte.
Cisti quasi chiusa con sutura del tavolo
esterno alla borsa frontale destra

28 Gennaio 1918




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dot. Braccini Corrado - Classe 1996

258 tante



DATA

DIARIO

17/1 Medica a più altern. = Viti metalliche
aslett.
1918 Il malato ha molti infirmità nelle condiz. generali;
le condiz. si possono vedere in un rapporto
di amputazione molto ristretta da quando è entrato
al Pad. - Le ganglie sono rotonde - Le condiz. a
scendere - Le ferite alla base frontale e chiusa.
3 febbraio 1918 - Stomacchi - Condiz. generali alterate dei bordi
della piaga - Recessione del condil. femoral.
previo taglio a lembi anteriori e poster.
La superficie scheletrica viene ricoperta
da un lembo grasso folto delle
fibre laterali dell'art. Il lembo viene
fissato mediante punti di catgut.

Temperature 39.2 rispetto


" 37.8 = 38.3 "

" 38 = 38.5 "

" 38.2 = 39 "

" 38.2 = 38.6 "

Temp°



GIORNO	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
11	8		1/2 spc. Latta	
18	"		1/2 spc. Latta	Staphylococcus
19	"		1/2 spc. Latta	
20	"		1/2 spc. Latta	
21	"		1/2 spc. Latta	Staphylococcus
22	"		1/2 spc. Latta	
23	"		1/2 spc. Latta	
24	"		1/2 spc. Latta	Staphylococcus
25	"		1/2 spc. Latta	
26	"		1/2 spc. Latta	
27	"		1/2 spc. Latta	
28	"		1/2 spc. Latta	Staphylococcus
29	"		1/2 spc. Latta	
30	"		1/2 spc. Latta	
1	9		1/2 spc. Latta	Staphylococcus
2	"		1/2 spc. Latta	
3	"		1/2 spc. Latta	
4	"		1/2 spc. Latta	Staphylococcus
5	"		1/2 spc. Latta	
6	"	La ferita ancora non è granata beni e la suppurazione è molto violenta	1/2 spc. Latta	Staphylococcus
7	"		1/2 spc. Latta	
8	"		1/2 spc. Latta	
9	"		1/2 spc. Latta	Staphylococcus
10	"		1/2 spc. Latta	
11	"		1/2 spc. Latta	
12	"		1/2 spc. Latta	Staphylococcus
13	"		1/2 spc. Latta	
14	"	La ferita ancora non è granata	1/2 spc. Latta	

105/12
2
169 Amputato
N. 913 del Catal.
(R. 1917)
Stabilimenti Sanitari di Tappa di Cividale
SEZIONE SEMINARIO
104° OSPEDALE DA CAMPO DELLA ARMATA
CARTELLA CLINICA

GRADO, COGNOME E NOME	ESERCITO	NUMERO di matricola	DATA di entrata	SUCCESSIVE TRASLOCAZIONI	DATA dell'uscita definitiva
Sold Braccini Corvide	(2) Nash CORPO 258 fant	9 Bersaglieri 1897	14-7-17	Cisballe 3-8-17 U.D. me. 4-8-17 dell'ingegn. di Teramo 14-9-17	

Fortunato e In. Giulio Mario.
DIAGNOSI.
 Ferita da scheggia & granata regione spirale destra; infortunio di scheggia
 ossee nella cavità oraria. frattura esposta del femore sinistro con gangrena
 della gamba - Amputazione 1/2 inf. coscia S.
 U. g. 100 S. e.

DATA	ANNO	SESSO	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE	ANNOTAZIONI
12	luglio		Riferisce che il 10 cor. prese dove veniva ferito da scheggia di granata. Prescritta ferita al cranio regione frontale destra con appuntamento di scheggia ossea nella cavità cranica e fuoriuscita di sostanza cerebrale: ferita a canale - compilo a punto cieco da pallottole di shrapnel al ginocchio sinistro interessante l'articolazione -	Bucc. latte	Autopsia - Strisamento dei tessuti molliti della regione frontale Allargamento della fronte cranica massima parte pinna ostiosa. Estrazione di la scheggia ossea libera nella cavità cranica e una aderente.	L'Inferno... dipendere da causa di... ferito guerra 1902

DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
		Piccoli abrasioni superf. cili. all'alluce del piede destro.		
3	lugli.	La gamba si presenta fredda la pelle erigibile.	Latte Mod.	Estirpazione di una fellelletta di Shapnel dalla regione poplitea sinistra.
4	"	37.9. 38.4 - spingimento del focolaio di frattura del femore ed artrosomia laterale interna infezione sulla coscia nel focolaio di maggiore erepichio sottoludano.	Latte Mod. clintea di Monum. di H. 50 Charley eg 50 Laudanum facia V Acqua 200g	Medicazione
5	-	gangrena di tutta la gamba sinistra. Infiammazione sottocutanea della coscia	clintea, latte Mod.	Med.
16		37.9. 38.1		
17		37.8 - 39	Latte Mod. affaride	Med.
18		37.8 - 38.2	"	
19		37.9 38.1	"	Med.
20		37.8 38.1	"	Med.
21		37.7 38.1	"	Med.
22		37.6 37.9	"	Med.
23		37.6 38.2		Med.
24				Med.
25		Circa due centimetri sopra il soleo di il marcatore della gangrena si taglia la pelle della gamba e si dischiaccia il puncchio laserando per tutta la sua gangrenosa che potrà eliminarsi sponta- neamente nel corso della vita.		

DIARIO

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE e ANNOTAZIONI
26	lugli	37.4 - 37.9	Latte Mod. affaride	Medicazione
27	"	37.1 - 38	"	Med.
28	"	37.4 - 37.9	"	Med.
29	"	37.5 - 37.8	"	Med.
30	"	37.2 - 39	"	Med.
31	"	37.1 - 37.9	"	Med.
1	Agosto.	37. - 37.5	"	Apportazione di abbondante tissuto necrotico della regione poplitea.
2	"	Ottimo andamento della ferita.	"	
3	"			
4	8.	37. - 38.6		U.O. Presenta. Menzione di desarticolazione all'interno inferio- re della coscia denudato di tegu- menti non solo alla sua estrema

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



La malattia dipende da
e usa di servizio.

Il Capo Riparto
Alberici

Stabilimenti Sanitari di Tappa di Civitate
SEZIONE SEMINARIO

DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE o ANNOTAZIONI
		dinpra. all'esterno del mon- cone l'epifisi femorale mostra una frattura parallela del condilo interno. Nella parte posteriore o inferiore della cassa esiste una voluminosa fusce overmale da cui si osserva abbondante pus ed al fondo della quale si palpa un forovio di frattura a nicchia del femore immediatamente al di sopra della parte condilica. 2° Piccola F. alla regione frontale. D. praticata dal chirurgo ed in parte bene guarita. giante, sul fondo della quale si osserva la tortuga cere- brale gorgie, ma pulsante.	2 minestri 1/2 bistecca 1/2 v. c.p.	considerazione Gruppo di una fusce eccessiva lungo la linea post. 2.00 del femore

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Il Capo reparto

L. R.

DIARIO.

Giorno	MESE	SINTOMI	ORDINAZIONI	OPERAZIONI CHIRURGICHE o ANNOTAZIONI
		OSPEDALE CHIRURGICO CONTUMACIALE 1° PADIGLIONE		
8		Si conferma gonfiato sopra	1/2 ur. Sott. uovo	reg. obliquo
9			1/2 ur. Sott. uovo	
10			1/2 ur. Sott. uovo	reg. obliquo
11			1/2 ur. Sott. uovo	
12		Abbondante continua la vergine dalla sana a sinistra in tutta alla parte posteriore e in della cassa.	1/2 ur. Sott. uovo	reg. obliquo
13			1/2 ur. Sott. uovo	
14		Dalla pressione sul moncone rim- puori dalla uovo apertura pus	1/2 ur. Sott. uovo	Si macchi al dorso di stile si allargano i gharuno esistente e si pratica una nuova incisione al lato esterno della cassa, che nuovo la uovo cassa - sufficiente
15				
16		Dalla punta della fista si estrae un piccolo sequestro osso. Lo suppu, ragione del mon- ne e di molto di.		